



## NORMAS PARA BIOPSIA HEPÁTICA

### NORMAS PARA EL PACIENTE

- Una semana antes suspenda la toma de **antiagregantes** (medicamentos utilizados para prevenir la trombosis) como ácido acetilsalicílico (Aspirina®, Adiro®, Bioplak®, Tromalyt®) y clopidogrel (Iscover® o Plavix®).
- Si está tomando **anticoagulantes** como Sintrom®, Aldocumar® o Tedicumar®, es necesario suspenderlos 3 a 5 días antes de la biopsia hepática y sustituirlos por otro tipo de anticoagulante inyectado, por lo cual debe ponerse en contacto a tiempo con su hematólogo.
- No se olvide de leer y llevar consigo la hoja del **consentimiento informado**, que deberá firmar antes de realizar la exploración.
- Informe a la enfermera y al médico que le va a realizar la exploración sobre cualquier **enfermedad importante** que padezca, **alergias** y **medicamentos que toma habitualmente**.

### NORMAS PARA ENFERMERÍA

#### Normas para antes de la biopsia hepática

- El paciente debe permanecer **en ayunas desde ocho horas antes** de la prueba.
- Se debe colocar una **vía intravenosa en el BRAZO IZQUIERDO**.
- Debe disponerse de una **analítica reciente**, que incluya **hemograma y coagulación**.
- Todos los pacientes deben firmar el **consentimiento informado**.

#### Normas para después de la biopsia hepática

- El paciente debe permanecer en **decúbito lateral derecho** (sobre el lugar de punción) **durante 2-3 horas**.
  - **Dieta absoluta durante 6 horas**. Posteriormente dieta normal
  - **Constantes (TA y FC) cada 30 minutos durante 2 horas**. Posteriormente constantes cada 8 horas.
  - Si presentara dolor administrar Nolotil 1 ampolla IV disuelta en 100 cc de suero salino 0.9%.
  - En caso de palidez, sudoración, disnea, hipotensión o taquicardia, avisar al médico de Aparato Digestivo responsable o al médico de guardia.
  - Otras normas:
- 
-